



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA**  
**PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO**  
**COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS PÚBLICOS**  
**CAMPUS SOUSA**

# **Caderno de Questões**

## **Programa de Residência em Clínica Médica de Pequenos Animais**

**Programa de Pós-Graduação na modalidade de  
Residência em Área Profissional de Saúde em  
Medicina Veterinária – Turma 2026-2028**

**Janeiro de 2026**





**Atenção:** Cada questão da Prova Escrita Objetiva contém cinco alternativas, de “A” a “E”, devendo o candidato assinalar **apenas uma alternativa**, aquela que considerar correta em relação ao enunciado da respectiva questão, e, em seguida, **transcrevê-la para o Cartão-Resposta**, dentro do período determinado para a realização da prova.

01. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é INCORRETO afirmar que compete ao Sistema Único de Saúde:

- (A) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (B) Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.
- (C) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano e animal.
- (D) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (E) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação.

02. A Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 define as competências e as atribuições concernentes ao SUS da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Nessa perspectiva, analise as alternativas a seguir de modo a correlacionar a competência ao respectivo ente federado.

- I. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- II. Participar, junto com os órgãos afins, do controle de agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana.
- III. Elaborar o planejamento estratégico Nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os Estados, Distrito Federal e Municípios.

- (A) I: Estado e Distrito Federal – II: Estado e Distrito Federal – III: União
- (B) I: Estado e Distrito Federal – II: Município e Distrito Federal – III: União
- (C) I: Município e Distrito Federal – II: Estado e Distrito Federal – III: União
- (D) I: União – II: Estado e Distrito Federal – III: Município e Distrito Federal
- (E) Nenhuma das alternativas

03. Considerando a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, qual doença ou agravo tem periodicidade de notificação semanal?

- (A) Doença de Chagas Aguda
- (B) Doença aguda pelo vírus Zika
- (C) Febre amarela
- (D) Febre Maculosa e outros Riquetsioses
- (E) leptospirose

04. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória a autoridade competente de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelo estabelecimento de saúde, públicos ou privados. Considerando as doenças ou agravos, analise as alternativas cuja notificação imediata deve ser realizada APENAS pela Secretaria Municipal de Saúde.

- (A) Acidente por animal peçonhento.
- (B) Doença de Chagas Aguda.
- (C) Doença aguda pelo vírus Zica em gestante.
- (D) Monkeypox.
- (E) Raiva humana.

05. Referente ao campo de atuação do SUS, em conformidade com a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança dos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos, refere-se às ações de:

- (A) Vigilância sanitária.
- (B) Vigilância epidemiológica.
- (C) Saúde do trabalhador.
- (D) Assistência terapêutica.
- (E) Saúde bucal.

06. De acordo com a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, quando acontece um acidente com animal potencialmente transmissor da raiva, a notificação deve ser realizada a/ao:

- (A) Ministério da Saúde, de forma imediata.
- (B) Secretaria Estadual de Saúde, de forma semanal.
- (C) Secretaria Municipal de Saúde, de forma imediata.
- (D) Secretaria Estadual de Saúde, de forma imediata.
- (E) Secretaria Municipal de Saúde, de forma semanal.

07. A Lei Federal nº 8.080/1990, em suas alterações, dispõe sobre a tele-saúde que abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal e obedecerá a alguns princípios. Marque a alternativa que não apresenta um desses princípios.

- (A) autonomia do profissional de saúde.
- (B) responsabilidade digital.
- (C) disponibilização dos dados.
- (D) consentimento livre e informado do paciente.
- (E) dignidade e valorização do profissional de saúde.

08. De acordo com a Portaria GM/MS nº 635 de 2023, incumbe as equipes multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde – eMulti, prioritariamente, o desenvolvimento da integralidade das seguintes ações, exceto:
- (A) O atendimento individual, em grupo e domiciliar.
  - (B) A construção conjunta de projetos terapêuticos e intervenções no território.
  - (C) O apoio matricial.
  - (D) As discussões de casos.
  - (E) A não oferta de ações de saúde à distância.
09. Qual a carga horária individual mínima das categorias profissionais, excetuando a médica, exigida por equipe, de todas as modalidades dos multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde, de acordo com a Portaria GM/MS nº 635 de 2023.
- (A) 10 horas semanais
  - (B) 20 horas semanais
  - (C) 30 horas semanais
  - (D) 40 horas semanais
  - (E) 44 horas semanais
10. Marque a alternativa que não corresponde a um princípio da Política Nacional de Vigilância em Saúde.
- (A) Conhecimento do território.
  - (B) Integralidade.
  - (C) Descentralização político-administrativa.
  - (D) Universalidade.
  - (E) Promover a cooperação e o intercâmbio técnico científico no âmbito nacional e internacional.
11. O gênero *Giardia* são protozoários flagelados pertencentes ao filo Sarcomastigophora, classe Zoomastigophora e ordem Diplomonadida, sendo considerado o principal grupo de parasito da família Hexamitidae, podendo acometer o trato intestinal de todas as classes de vertebrados. Sobre a giárdia, marque a alternativa correta:
- (A) Trofozoíto é formado por dois núcleos ovais na superfície dorsal, sendo o cisto o estágio latente e resistente, e a forma responsável pela transmissão do agente.
  - (B) Cisto é uma estrutura ovoide, sendo o estágio ativo e móvel encontrado no lúmen do trato intestinal dos hospedeiros.
  - (C) A transmissão ocorre por via fecal-oral por meio da ingestão de trofozoíto contidos na água e nos alimentos contaminados e a infecção ocorre com maior frequência nos animais idosos.
  - (D) Pode ser realizado exames laboratoriais com amostras de sangue e fezes para detectar a existência de cistos ou trofozoítos. Vale ressaltar que os animais infectados eliminam cistos de maneira contínua.
  - (E) As principais complicações da giardiase crônica estão associadas à má absorção de gordura e nutrientes, produzindo efeitos graves, principalmente em filhotes e animais jovens.

12. As erliquioses são doenças infecciosas transmitidas por carrapatos, que acometem mamíferos domésticos e são causadas por bactérias dos gêneros *Ehrlichia* e *Anaplasma*. Sobre a erliquiose, marque a alternativa INCORRETA:

- (A) *Ehrlichia* penetra nas células mononucleares de defesa. Dentro da célula hospedeira, ela inibe a fusão de endossomos aos lisossomos, como mecanismo de escape do hospedeiro, multiplicando-se seguidamente em dois estágios (os corpúsculos iniciais e as mórulas).
- (B) Os corpúsculos iniciais são caracterizados por grânulos subesféricos de coloração rósea a púrpura, medindo de 0,4 a 2  $\mu\text{m}$ , enquanto as mórulas são constituídas por um a três vacúolos de membrana simples, contendo de 1 a 40 corpúsculos, podendo variar de 2 a 4  $\mu\text{m}$  de diâmetro.
- (C) A trombocitopenia é o achado mais comum nas três fases da doença. Sua ocorrência pode ser ocasionada pelas perdas por consumo nos casos de vasculite, por destruição imunomediada e sequestro de plaquetas no baço.
- (D) O tratamento para erliquiose monocítica canina se baseia na administração de antibacterianos, principalmente os da classe das tetraciclina, com dose 5 a 10 mg/kg, via oral ou intravenosa, de 12 a 24 h durante 21 dias.
- (E) Na fase crônica da doença, os resultados dos exames hematológicos demonstram pancitopenia exacerbada. Assim, o exame citológico da medula óssea deve ser realizado para diferenciar outras causas de pancitopenia, como mielonecrose, mielofibrose e síndromes mieloplásticas.

13. Insuficiência renal aguda (IRA) é uma síndrome resultante de diminuição abrupta e persistente da taxa de filtração glomerular, cujas manifestações incluem aumento progressivo das concentrações séricas de ureia e creatinina. Diante disso, marque a alternativa correta em relação a classificação e caracterização da azotemia.

- (A) Na azotemia pós-renal dentre os mecanismos envolvidos podemos citar a retenção de urina, rins morfológicamente normais e capazes de desempenhar suas funções; as causas mais comuns são desidratação, insuficiência cardíaca congestiva, choque hipovolêmico ou séptico, redução da pressão coloidosmótica.
- (B) Na azotemia pós-renal como manifestações clínicas e laboratoriais podemos citar: azotemia varia de leve até grave, dependendo do tempo de evolução. Pode haver uremia, ausência ou alteração da micção de acordo com a causa.
- (C) Na azotemia renal intrínseca as causas mais comuns são obstrução ou ruptura de ambos os ureteres ou da bexiga, obstrução uretral com manifestações clínicas e laboratoriais, azotemia leve ou moderada, oligúria fisiológica e densidade urinária alta.
- (D) Na azotemia pré-renal apresenta manifestações clínicas e laboratoriais como azotemia leve ou moderada, oligúria fisiológica e densidade urinária alta; as causas mais comuns obstrução ou ruptura de ambos os ureteres ou da bexiga e obstrução uretral.
- (E) Na azotemia pré-renal tem como causas mais comuns a desidratação, insuficiência cardíaca congestiva, choque hipovolêmico ou séptico, redução da pressão coloidosmótica, obstrução ou ruptura de ambos os ureteres ou da bexiga e obstrução uretral.

14. O protocolo de tratamento da Insuficiência renal aguda (IRA) é complexo porque requer ajustes frequentes, além de variar em função da causa das lesões, das complicações e das possíveis comorbidades. Diante disso, marque a alternativa correta:

- (A) A fluidoterapia é a base fundamental do tratamento da IRA e, juntamente com o restabelecimento do fluxo urinário, constitui intervenção essencial para todos os casos e a terapia de suporte varia de acordo com o quadro clínico inicial e com a evolução.
- (B) Em todos os casos é possível estabelecer a etiologia da lesão renal que resultou em IRA para que o tratamento específico possa ser instituído. Ainda, os corticoides, como regra geral, é o medicamento de escolha para o tratamento de IRA.
- (C) Em doenças renais infecciosas tais como pielonefrite e nefrite intersticial por leptospirose os antibióticos, anticoagulantes e os corticoides são apropriados e devem ser iniciados imediatamente.
- (D) O cálculo do volume da fluidoterapia a ser administrado é feito com base no peso corporal, idade do animal, raça, sexo, percentual de desidratação estimado e as perdas previstas para o período de fluidoterapia.
- (E) Medicamentos para tratamento da gastrite e controle dos vômitos em IRA em cães pode citar ranitidina (inibidor de bomba de prótons) na dose 4 a 7 mg/kg IV, VO, a cada 24 h (cães) e Omeprazol (antagonista de receptor H2) 5 a 6 mg/kg, VO, IM a cada 8 h.

15. Cães e gatos com Doença renal crônica (DRC) são classificados segundo as recomendações da International Renal Interest Society (IRIS), que se baseia nos valores séricos de creatinina, em marcadores de lesão renal e associam a estes a manifestação clínica. Diante disso, marque a alternativa correta:

- (A) Nos estágios I, II e III da DRC o animal geralmente é assintomático, e os cães podem ou não apresentar apenas poliúria e polidipsia.
- (B) As alterações do sistema neuromuscular relacionam-se com encefalopatias e neuropatias decorrentes do quadro de uremia e são mais frequentes nos estágios II e III.
- (C) No estágio I da DRC, o animal não apresenta azotemia, já no estágio II pode-se dizer que a azotemia é discreta, com os valores de creatinina sérica entre 1,4 e 2 mg/dℓ, para cães e 1,6 e 2,8 mg/dℓ, para gatos.
- (D) O estágio III refere-se à evolução final da doença, com diminuição marcante do número de néfrons, comprometendo a maioria das funções do rim.
- (E) No estágio I a azotemia é moderada, os valores de creatinina sérica estão entre 2,1 e 5 mg/dℓ, para cães, e 2,9 e 5 mg/dℓ, para gatos.

16. A urolitíase é a formação de cálculos urinários a partir de cristais menos solúveis na urina, não deve ser considerada uma doença isolada do trato urinário, mas sim uma afecção multifatorial. Diante disso, marque a alternativa correta:

- (A) O oxalato de cálcio pode se apresentar em formato esférico, elipsoide ou tetraédrico, em pequena ou em grande quantidade e de diferentes tamanhos. São compostos de 100% de magnésio, amônio e fosfato e, em alguns casos, podem conter porcentagens variadas de fosfato de cálcio ou carbonato fosfato de cálcio.
- (B) Os cálculos de estruvita é um componente mineral comum de cálculos compostos. Pode ser encontrado de duas formas: mono-hidratada e di-hidratada. A mono-hidratada é mais frequente em cães.
- (C) O oxalato de cálcio pertence à família de cálculos de purina que ocorre naturalmente em cães e são produtos do metabolismo de ribonucleotídeos de purina. As substâncias mais encontradas são urato de amônio e sais de ácido úrico.
- (D) Cálculos de sílica são diagnosticados com baixa frequência nos animais. Os cães acometidos normalmente apresentam apetite “depravado” ou são submetidos a dieta com altos teores de cereais. As raças mais acometidas são Pastor-alemão, Old English Sheepdog, Golden e Labrador Retriever.
- (E) Cálculos de cistina pertence à família de cálculos de purina que ocorre naturalmente em cães e são produtos do metabolismo de ribonucleotídeos de purina. Eles são observados com grande frequência na urina de cães da raça Dálmata e podem ser encontrados em cães com doenças hepáticas ou com desvio portossistêmico.

17. O hipotireoidismo é um dos maiores desafios diagnósticos dentre as doenças endócrinas em pequenos animais. Se diagnosticado com precisão e tratado de maneira adequada, é uma condição que apresenta excelente prognóstico a longo prazo. Sobre o hipotireoidismo, marque a alternativa correta:

- (A) O tratamento de escolha é a levotiroxina sódica (L-tiroxina), que deve ser administrada inicialmente na dosagem de 1 mg/kg a cada 24 h.
- (B) O tratamento de escolha é a levotiroxina sódica (L-tiroxina), que deve ser administrada inicialmente na dosagem de 0,02 mg/kg a cada 12 h.
- (C) O tratamento de escolha é a levotiroxina sódica (L-tiroxina), que deve ser administrada inicialmente na dosagem de 5 mg/kg a cada 6 h.
- (D) O tratamento de escolha é a levotiroxina sódica (L-tiroxina), que deve ser administrada inicialmente na dosagem de 0,30 mg/kg a cada 48 h.
- (E) O tratamento de escolha é a levotiroxina sódica (L-tiroxina), que deve ser administrada inicialmente na dosagem de 0,5 mg/kg a cada 8 h.

18. O hipertireoidismo é uma enfermidade crônica causada pela excessiva produção e secreção dos hormônios tiroxina (T4) e tri-iodotironina (T3) pela glândula tireoide anormal. Diante disso, marque a alternativa correta:

- (A) Essa afecção acomete gatos filhotes e jovens. Os sintomas clássicos de hipertireoidismo incluem perda de peso, taquicardia, hiperatividade, polifagia, poliúria e polidipsia.
- (B) Os sintomas clássicos incluem taquicardia, hiperatividade, perda de peso, polifagia, poliúria, polidipsia, diarreia, fraqueza muscular, grande volume fecal, padrão respiratório ofegante, vômito, crescimento rápido das unhas, alopecia e flexão ventral de pescoço.
- (C) As concentrações séricas de T4 total e/ou livre e T3 são altamente correlacionadas em gatos hipertireóides, mas a mensuração de T3 é preferível a T4 devido à melhor sensibilidade diagnóstica.
- (D) Características clínicas incluem: polifagia, poliúria, polidipsia, distensão abdominal secundária a obesidade visceral e hepatomegalia, taquipneia, atrofia e fraqueza muscular, letargia, cansaço fácil, intolerância ao calor.
- (E) O hormônio T4 adentra as células mais rapidamente, tem início de ação mais curto e potencial de três a cinco vezes maior do que a T3, sendo a fração biologicamente ativa.

19. As glândulas adrenais dos mamíferos consistem em duas partes distintas (o córtex e a medula), que diferem entre si morfológica, funcional e embriologicamente. As doenças sediadas no córtex adrenal compreendem o hiperadrenocorticismismo (síndrome de Cushing - HAC), o hipoadrenocorticismismo (doença de Addison) e o hiperaldosteronismo primário. Diante disso, marque a alternativa INCORRETA:

- (A) Abdome pendular ou em tonel é sintoma clássico do hiperadrenocorticismismo, consistindo em acúmulo de tecido adiposo em região abdominal (obesidade visceral ou central), aliado à atrofia e à astenia dos músculos abdominais, secundários ao catabolismo proteico.
- (B) O hiperadrenocorticismismo iatrogênico resulta da administração excessiva de glicocorticoides exógenos, geralmente prescritos para controlar distúrbios alérgicos ou imunomediados.
- (C) As alterações clínicas envolvendo o sistema tegumentar são observadas em 60 a 90% dos casos, podendo ser os primeiros sintomas referidos pelos proprietários de cães com síndrome de Cushing.
- (D) O mitotano pode ser empregado tanto no tratamento de HAC hipofisário como no de HAC adrenocortical. Na fase de indução, a dose inicial recomendada para o tratamento do HAC hipófise-dependente é de 60 mg/kg, 1 vez/dia, administrada por aproximadamente 21 dias.
- (E) Dentre as características clínicas podemos citar: polifagia, poliúria, polidipsia, distensão abdominal secundária a obesidade visceral e hepatomegalia, taquipneia, atrofia e fraqueza muscular, letargia, cansaço fácil, intolerância ao calor, alterações no ciclo estral, atrofia testicular, além de diversas alterações cutâneas representadas por alopecia não pruriginosa, atrofia cutânea, telangiectasia, estriações, comedos, hiperpigmentação, calcinose cutânea e piodermite recidivante.

20. A consistência de determinada estrutura pode ser definida de diversas maneiras. Diante disso, marque a alternativa correta:

- (A) Flutuante: determinada pelo acúmulo de líquidos, tais como sangue, soro, pus ou urina, em uma estrutura ou região.
- (B) Pastosa: quando a estrutura não cede, por mais forte que seja a pressão (ossos e alguns tecidos tumorais).
- (C) Firme: quando uma estrutura cede facilmente à pressão e permanece a impressão do objeto que a pressionava, mesmo quando cessada (edema: sinal de Godet positivo).
- (D) Mole: observada quando determinado tecido contém ar ou gás em seu interior. À palpação, a sensação é de movimentação de bolhas gasosas.
- (E) Pastosa: quando a estrutura reassume seu formato normal após cessar a aplicação de pressão à mesma (tecido adiposo); é uma estrutura macia, porém flexível.

21. A pele é o maior órgão de um organismo. Trata-se da barreira anatômica e fisiológica entre o organismo e o meio ambiente, promovendo proteção contra lesões físicas, químicas e microbiológicas. Sobre a semiologia da pele, marque a alternativa correta:

- (A) Telangiectasia consiste em coloração avermelhada da pele decorrente de vasodilatação. Em geral, ocorre em dermatopatias inflamatórias, estando frequentemente associado a quadros pruriginosos.
- (B) Acromia consiste em coloração avermelhada da pele decorrente de extravasamento de hemácias na derme.
- (C) Telangiectasia consiste na diminuição do pigmento melânico. Ocorre frequentemente em casos de hiperadrenocorticism e cicatrização atrófica.
- (D) Gomas são nódulo ou nodosidade que sofre depressão ou ulceração na região central e elimina material necrótico.
- (E) Prurido consiste no aumento de volume de consistência flutuante, não encapsulado, de tamanho variável, proeminente ou não, contendo líquido purulento na pele ou tecidos subjacentes.

22. O diagnóstico e o tratamento das doenças respiratórias em animais são uma constante e uma das principais atuações na clínica veterinária. É de grande importância o diagnóstico precoce de uma afecção para a instituição de tratamento e a prevenção de novos episódios de doença. Diante disso, marque a alternativa correta:

- (A) Estridor é um som alto e grosseiro que resulta de quantidade excessiva de palato mole ou massas na região faríngea.
- (B) Taquipneia é um som inspiratório agudo (semelhante a um assovio fino), indicativo de distúrbios na laringe.
- (C) Hemoptise é uma séria manifestação clínica de afecção respiratória caracterizada pela eliminação de sangue pela boca e pelas narinas, proveniente do trato respiratório inferior.
- (D) Ortopneia refere-se à dificuldade respiratória. Pode apresentar natureza inspiratória, expiratória ou mista, sendo muito importante essa determinação.
- (E) Apneia é a diminuição da frequência respiratória; Taquipneia é o aumento da frequência respiratória; Bradipneia: é a ausência total de respiração.

23. A pele é o maior órgão do corpo animal, e as dermatopatias estão entre as doenças mais comuns em cães e gatos. Assim, o diagnóstico e tratamento adequados dessas condições são essenciais para o bem-estar dos animais e para a tranquilidade de seus proprietários. Diante do contexto, marque a alternativa correta:

- (A) O *notoedres cati* parasita principalmente de gatos, sendo ácaros que apresentam pedículos de sustentação das ventosas não-articulados e de comprimento mediano em suas patas, possuindo mais estriações corpóreas e um ânus dorsal.
- (B) *Otodectes cynotis* tem todo o seu ciclo de vida nos folículos pilosos e nas glândulas sebáceas de seu hospedeiro. Esse ácaro apresenta formato de “charuto”, com patas grossas e curtas.
- (C) *Demodex* parasita principalmente de gatos, são ácaros que podem sobreviver por até 21 dias fora do hospedeiro. Os ácaros adultos são pequenos (de 200 a 400 µm), ovais e brancos, com dois pares de patas curtas.
- (D) *Sarcoptes scabiei* é um ácaro psoroptídeo que não escava túneis, mas infesta o conduto auditivo externo e a pele adjacente de cães e gatos. A produção de cerume escuro é característica de otite otodécica.
- (E) O ácaro *Demodex* causa lesões primeiramente na extremidade proximal medial dos pavilhões auriculares e, em seguida, disseminam-se para a parte superior da orelha, face, pálpebras, pescoço, patas e região perineal.

24. A raiva é uma doença infecciosa viral cuja base patológica principal é um processo inflamatório não infiltrativo do sistema nervoso central, levando a sinais predominantemente nervosos. Essa doença é naturalmente transmissível entre mamíferos, caracterizando-se como zoonose clássica e de evolução fatal em todas as espécies. Diante disso, marque a alternativa correta:

- (A) O vírus da raiva é uma espécie dentro do gênero *Lyssavirus*, na família Rhabdoviridae, ordem Mononegavirales. No Brasil, a variante do vírus em cães e gatos é a denominada variante antigênica 2 (AgV2), enquanto no morcego hematófago *Desmodus rotundus*, tem-se a variante antigênica 3.
- (B) O vírus da raiva costuma ter acesso a um novo hospedeiro exclusivamente por meio de inoculação intramuscular, como em mordidas. Não havendo relatos de outras formas de transmissão.
- (C) Em cães e gatos, a forma clássica de manifestação clínica da raiva pode ser dividida nas fases prodrômica, neurológica aguda e terminal, de coma e morte. Sendo a fase prodrômica a intensificação da agressividade, podendo haver convulsões, automutilação, sialorreia e paralisia flácida ascendente.
- (D) Recomenda a vacinação de cães e gatos a partir de 5 meses de idade, com revacinação após 3 meses e em seguida anual. Tal medida diminui a prevalência de raiva nos carnívoros domésticos.
- (E) O vírus da raiva é capaz de se replicar apenas em neurônios propriamente ditos, não tendo capacidade de atingir tecido muscular, bem como, órgãos como pulmões, rins e fígado, córnea.

25. A panleucopenia felina é uma doença viral aguda, altamente contagiosa, que acomete felídeos domésticos. Diante do exposto, marque a alternativa correta:

- (A) A panleucopenia é causada pelo vírus coronavírus felino, um membro do gênero *Parvovirus*, família Coronaviridae, da ordem dos Nidovirales, estritamente relacionado com o parvovírus canino tipo 5 (CPV-5) e outros parvovírus de carnívoros selvagens.
- (B) A transmissão ocorre por via fecal-oral, sendo o vírus eliminado exclusivamente pelas fezes. Ainda, pode acontecer a transmissão indireta, por meio de fômites e alguns insetos na qual atuam como vetores mecânicos. A transmissão transplacentária não é possível.
- (C) A panleucopenia é predominantemente uma doença de animais adultos, de 4 a 5 anos de idade, embora como regra, os felinos mais jovens desenvolvam infecção branda ou assintomática. A taxa de mortalidade é baixa: estima-se que em quadros agudos varie de 10%.
- (D) Após a infecção pela via fecal-oral, o vírus inicialmente se replica em mucosa e tecido linfóide da orofaringe. O período de incubação é de 30 dias. Como o genoma viral é composto de RNA-vírus envelopado de fita simples, o vírus necessita de células na fase S de divisão para sua replicação.
- (E) Possíveis diagnósticos diferenciais para a panleucopenia felina são septicemia bacteriana aguda (*Salmonella spp.*, *Clostridium piliforme*), intoxicação, parasitismo intestinal maciço, infecção pelo vírus da leucemia felina (FeLV), linfoma, corpos estranhos gastrintestinais (especialmente os perfurantes), toxoplasmose aguda e abscessos ou granulomas mesentéricos

26. Os cílios são estruturas que promovem a defesa ocular, e que estão diretamente associados na promoção da integridade visual. As alterações que envolvem os cílios causam desconforto ocular, uma vez que atacam diretamente com a córnea. Diante disso, marque a alternativa correta:

- (A) Cílio ectópico: cílio adicional emergindo através da conjuntiva a partir das glândulas de meibômio; Distiquíase: cílios adicionais emergindo das aberturas das glândulas de meibômio e Triquíase: cílios e/ou pelos faciais (localização normal) direcionados à córnea e conjuntiva.
- (B) Distiquíase: cílio adicional emergindo através da conjuntiva a partir das glândulas de meibômio; Triquíase: cílios e/ou pelos faciais (localização normal) direcionados à córnea e conjuntiva e Cílio ectópico: cílio adicional emergindo através da conjuntiva a partir das glândulas de meibômio;
- (C) Cílio ectópico: cílios e/ou pelos faciais (localização normal) direcionados à córnea e conjuntiva; Distiquíase: cílios adicionais emergindo das aberturas das glândulas de meibômio e Triquíase: cílio adicional emergindo através da conjuntiva a partir das glândulas de meibômio;
- (D) Cílio ectópico: cílio adicional emergindo através da conjuntiva a partir das glândulas de meibômio; Triquíase: cílios adicionais emergindo das aberturas das glândulas de meibômio e Distiquíase: cílios e/ou pelos faciais (localização normal) direcionados à córnea e conjuntiva.
- (E) Distiquíase: cílio adicional emergindo através da conjuntiva a partir das glândulas de meibômio; Triquíase: cílios adicionais emergindo das aberturas das glândulas de meibômio e Cílio ectópico: cílios e/ou pelos faciais (localização normal) direcionados à córnea e conjuntiva.

27. Malasseziose está relacionado com a micose superficial causada por leveduras do gênero *Malassezia*, que normalmente compõem a microbiota da pele de animais domésticos, sendo *Malassezia pachydermatis* a espécie mais adaptada aos animais. Diante disso, marque a alternativa correta:

- (A) As dermatites por *Malassezia pachydermatis* são mais relatadas em gato e no exame direto das amostras, podem ser observadas células leveduriformes dentro de macrófagos ou livres, únicas ou com brotamentos de base estreita, com pequeno halo mais claro ao redor.
- (B) Para o tratamento da malasseziose são utilizados para a terapia oral tanto os derivados imidazóis quanto os triazóis. O cetoconazol, 20 a 30 mg/kg, a cada 6 ou 8 h, durante 21 dias.
- (C) *Malassezia pachydermatis* faz parte da flora da pele e das mucosas de diversos animais e os sintomas mais comuns incluem prurido, eritema, crostas serosas ou gordurosas, alopecia, rarefação pilosa, hiperqueratose, odor característico e hiperpigmentação e liquenificação, em casos crônicos.
- (D) Para o tratamento da malasseziose a dose recomendada para o itraconazol, em micoses superficiais em cães, é de até 20 mg/kg/dia e em gatos é de 10 mg/kg/dia, a cada 6 ou 8h, durante 21 dias.
- (E) *Malassezia pachydermatis* habita locais como mucosas e pele de inúmeros animais, entre eles cães e gatos. Os locais anatômicos mais relacionados são pele, unhas, ouvido e mucosas dos sistemas geniturinário e gastrointestinal.

28. Pseudogestação ou pseudociese é um distúrbio endócrino, observado principalmente em cadelas. Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I-A pseudociese é uma condição apresentada por toda cadela não prenhe

PORQUE

II- Progesterona promove a lactação e contribui para o *comportamento materno*

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (E) As asserções I e II são falsas.

29. O criptorquidismo em cães é definido como a não descida de um ou ambos os testículos para a sua localização anatômica normal, sendo considerada a anormalidade testicular mais comum em cães. Diante disso, marque a alternativa INCORRETA:

- (A) O gubernáculo testicular estende-se da extremidade caudal do testículo para a dobra genital, direcionando a descida do testículo no trajeto da cavidade abdominal pelo canal inguinal até o interior do escroto. Logo, o criptorquidismo é resultado de um subdesenvolvimento ou uma excrescência do gubernáculo e falha em regredir e tracionar o testículo para dentro do escroto.
- (B) O criptorquidismo assume grande importância na clínica de pequenos animais principalmente por dois fatores: é uma doença hereditária controlada por um gene autossômico recessivo, limitado ao sexo; e por ser um fator de risco para o desenvolvimento de neoplasia testicular.
- (C) O testículo do cão geralmente atinge o seu posicionamento final até o 35º dia de vida. Em média, o canal inguinal pode permanecer aberto até os 24 meses de idade, permitindo a livre movimentação dos testículos próximos ao escroto até o seu completo fechamento. Por isso recomenda-se que o diagnóstico de criptorquidismo não deva ser feito antes dos 24 meses de idade.
- (D) O criptorquidismo canino é hereditário. O modo de herança, incluindo o número e a penetrância dos genes envolvidos, ainda é indefinido. Os genes responsáveis pelo controle da descida testicular são autossômicos e, portanto, podem ser carregados tanto por machos quanto por fêmeas.
- (E) Os riscos do desenvolvimento de neoplasias em testículos ectópicos, comparado aos testículos normais, são 9,2 vezes maiores. O cordão espermático dos testículos ectópicos também é predisposto à torção.

30. Condutas terapêuticas vêm sendo preconizadas para tumores venéreos transmissíveis (TVT), entre as quais podemos citar a criocirurgia, radioterapia, ressecção cirúrgica e quimioterapia antineoplásica. A quimioterapia citotóxica é o método mais eficiente. Diante disso, marque a alternativa correta:

- (A) A terapia com sulfato de vincristina, na dose de 0,025 mg/kg por via intravenosa, a cada 7 dias, determina a regressão do tecido tumoral.
- (B) A terapia com sulfato de vincristina, na dose de 0,50 mg/kg por via intravenosa, a cada 15 dias, determina a regressão do tecido tumoral.
- (C) A terapia com sulfato de vincristina, na dose de 0,10 mg/kg por via intravenosa, a cada 20 dias, determina a regressão do tecido tumoral.
- (D) A terapia com sulfato de vincristina, na dose de 0,30 mg/kg por via intravenosa, a cada 10 dias, determina a regressão do tecido tumoral.
- (E) A terapia com sulfato de vincristina, na dose de 0,20 mg/kg por via intravenosa, a cada 30 dias, determina a regressão do tecido tumoral.

31. Atendimentos de urgência e emergência em hospitais veterinários, frequentemente envolvem pacientes com suspeita de intoxicação, muitas vezes sem que se conheça o agente responsável. Não raramente, esses animais são admitidos em estágios avançados do quadro clínico, o que torna a rapidez no atendimento um fator decisivo para o desfecho do caso. Nessas situações, a prioridade da equipe é preservar a vida do paciente, garantindo a estabilidade das funções vitais. Considerando o manejo terapêutico da intoxicação, assinale a alternativa correta:

- (A) A indução do vômito é recomendada independentemente do estágio da intoxicação, sendo mais eficaz quando realizada entre 1 e 2 horas após a ingestão do agente tóxico, podendo remover de 40 a 60% do conteúdo gástrico.
- (B) Em situações de hipotermia, o paciente deve ser aquecido com fontes de calor controladas, sendo contraindicado o aquecimento das soluções cristaloides utilizadas na fluidoterapia.
- (C) A administração de diuréticos em pacientes intoxicados tem como objetivo promover diurese forçada, acelerando a eliminação renal do agente tóxico.
- (D) O carvão ativado é um método seguro, de baixo custo e eficiente, atuando por meio da ligação ao carbono, o que lhe confere propriedade adsorvente e favorece a eliminação de toxinas.
- (E) Tremores e crises convulsivas causadas por intoxicações podem ser tratados com benzodiazepínicos administrados por via intravenosa, não apresentando eficácia quando utilizados por via retal.

32. A insuficiência cardíaca congestiva é caracterizada como uma condição clínica complexa e figura entre as principais causas de óbito em pacientes portadores de enfermidades cardíacas. Essa síndrome decorre da incapacidade do coração em manter um débito adequado para suprir as necessidades do organismo, desencadeando respostas compensatórias neuro-hormonais. No atendimento de urgência, a conduta terapêutica tem como objetivo a rápida reversão dos sinais clínicos, promovendo a estabilização hemodinâmica do paciente. A respeito do manejo emergencial da insuficiência cardíaca congestiva, assinale a alternativa correta:

- (A) A hidralazina é o diurético mais indicado no tratamento do edema pulmonar de origem cardiogênica, devido ao seu rápido início de ação quando administrada por via intravenosa, com efeito máximo em aproximadamente 30 minutos.
- (B) O nitroprussiato de sódio é o principal vasoconstritor utilizado nessas situações, pois exerce potente ação sobre a circulação arterial e venosa, reduzindo a pressão venosa, melhorando a complacência vascular e diminuindo a pressão arterial sistêmica, o que pode favorecer o débito cardíaco.
- (C) Pacientes que apresentam ansiedade, agitação ou taquipneia intensa podem ser sedados, sendo o bitartarato de butorfanol indicado em casos de edema pulmonar cardiogênico, por não causar alterações hemodinâmicas relevantes.
- (D) A ventilação mecânica consiste em um suporte respiratório artificial baseado na aplicação de pressão positiva nos pulmões para garantir adequada oxigenação, devendo ser utilizada como primeira opção para suplementação de oxigênio.
- (E) A dobutamina é uma catecolamina sintética com predominante ação  $\beta_1$ -adrenérgica, sendo indicada principalmente em situações que exigem aumento da força ventricular, promovendo relaxamento cardíaco.

33. Na rotina clínica de cães e gatos o atendimento a neonatos é considerado especialmente complexo, em razão das elevadas taxas de mortalidade nos primeiros dias de vida, que podem alcançar valores significativos, uma vez que lida-se com a imaturidade dos sistemas fisiológico e imunológico. Essas características tornam os recém-nascidos mais vulneráveis às condições ambientais, agentes infecciosos e parasitários, por exemplo. Dessa forma, a pediatria veterinária assume papel fundamental na clínica de pequenos animais, tanto pelo manejo das afecções neonatais, quanto pela aplicação de medidas preventivas que contribuem para a melhora da sobrevivência e da qualidade de vida dos pacientes desde o nascimento. Considerando esse contexto, a chamada tríade neonatal crítica é composta por:

- (A) Hipotensão, hipovolemia e bradicardia
- (B) Desidratação, hipotermia, hipoglicemia.
- (C) Hipoglicemia, hipotermia e anemia
- (D) Hipóxia, anemia e desidratação
- (E) Hipertensão, hipertermia e hipoglicemia

34. Uma cadela da raça Labrador, 4 anos de idade foi atendida por um residente no Hospital Veterinário do IFPB, campus Sousa, logo após o desmame de uma ninhada de 7 filhotes. A tutora relatou que, após o término da amamentação, percebeu que a cadela apresentava apatia, prostração, emagrecimento e diminuição do apetite. Durante o exame físico, observou-se temperatura de 39.8°C, sensibilidade ao toque nas mamas, vermelhidão local e presença de leite residual.

Considerando o quadro descrito, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O diagnóstico mais provável é mastite aguda devido ao leite residual, e o manejo inicial envolve prevenção ou tratamento de infecção bacteriana e suspensão da lactação.
- (B) O quadro indica mastite aguda relacionada ao leite residual, e a conduta inicial deve buscar prevenir ou tratar infecção bacteriana e estimular a produção de leite.
- (C) Trata-se de mastite crônica por retenção de leite, sendo necessário tratar ou prevenir infecções bacterianas e estimular a lactação.
- (D) O caso sugere mastite crônica por leite residual, sendo suficiente apenas tratar para prevenir a infecção bacteriana com uso de antibióticos orais.
- (E) A suspeita mais provável é mastite crônica associada ao leite residual, sendo o tratamento inicial focado na prevenção ou controle de infecção bacteriana e na interrupção da lactação.

35. No que se refere à pancreatite em cães, marque a alternativa INCORRETA:

- (A) A administração de antimicrobianos deve ser realizada de maneira sistemática em todos os pacientes com pancreatite, mesmo na ausência de sinais de infecção bacteriana ou alterações sistêmicas.
- (B) Nos quadros agudos de pancreatite, o animal pode apresentar sinais compatíveis com abdome agudo, como dor abdominal intensa e episódios de vômito, além de manifestações sistêmicas como apatia, diminuição do apetite e desidratação.
- (C) Não existe, até o momento, um exame não invasivo capaz de confirmar definitivamente a pancreatite. Dessa forma, o diagnóstico clínico é estabelecido a partir da combinação de histórico, exame físico, testes laboratoriais e exames de imagem.
- (D) A dor abdominal constitui um dos achados clínicos mais relevantes na pancreatite aguda, podendo levar alguns pacientes a assumir a postura conhecida como “posição de prece”.
- (E) A avaliação radiográfica da cavidade abdominal apresenta utilidade limitada, uma vez que possui baixa sensibilidade para a identificação de pancreatite.

36. São agentes inotrópicos positivos, que podem ser utilizados no tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva em cães, EXCETO:

- (A) Digoxina
- (B) Dobutamina
- (C) Anfotericina
- (D) Dopamina
- (E) Digitoxina

37. A parvovirose canina é uma doença viral grave que afeta principalmente filhotes e caracteriza-se por alta taxa de mortalidade, se não tratada rápido e adequadamente. Considerando a fisiopatologia, sinais clínicos e manejo da doença, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A parvovirose é causada por um vírus que afeta principalmente o fígado, levando a icterícia e coagulopatias graves.
- (B) O principal sinal clínico é a diarreia hemorrágica, frequentemente acompanhada de vômitos, febre e desidratação.
- (C) Animais adultos totalmente vacinados têm risco elevado de desenvolver formas graves da doença.
- (D) O diagnóstico definitivo depende exclusivamente de radiografia abdominal.
- (E) O tratamento específico envolve administração de antivirais orais que eliminam o vírus do organismo.

38. A bronquite crônica em cães é uma doença respiratória persistente que se caracteriza principalmente por tosse prolongada. Pode estar associada a outras enfermidades, como colapso traqueal e em casos mais graves pode levar a hipertensão pulmonar.

Considerando os aspectos clínicos, diagnósticos e complicações, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A bronquite crônica geralmente cursa com febre alta e cianose nos estágios iniciais da doença.
- (B) O sintoma mais frequente é a tosse seca e persistente, que pode durar meses, embora exames complementares, como radiografias e broncoscopia, auxiliem na avaliação, o diagnóstico definitivo envolve a combinação de histórico clínico, exame físico e análise histopatológica.
- (C) A radiografia torácica normalmente apresenta infiltração difusa de base hepática, sendo essencial para confirmar o diagnóstico.
- (D) Animais com bronquite crônica raramente apresentam alterações no sistema respiratório, e a doença costuma ser autolimitada.
- (E) O tratamento se baseia exclusivamente em antibióticos de amplo espectro, independentemente da causa inflamatória ou infecciosa.

39. Crises convulsivas, como o *status epilepticus* (SE) e crises em série, configuram emergências neurológicas frequentes em pacientes veterinários, sendo comuns tanto na clínica geral, quanto no setor de especialidades. Essas situações estão associadas a elevados riscos de morbidade e mortalidade. O SE, em particular, representa um grande desafio terapêutico, podendo resultar em lesões cerebrais permanentes e complicações sistêmicas se o manejo for tardio. Além disso, alterações moleculares e fisiológicas podem ocorrer rapidamente, tornando as convulsões resistentes aos anticonvulsivantes convencionais.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Define-se como qualquer crise convulsiva que persista por mais de 5 minutos.
- (B) Os benzodiazepínicos constituem o tratamento de primeira linha, sendo o midazolam considerado mais potente que o diazepam.
- (C) O fenobarbital é uma alternativa terapêutica de segunda linha.
- (D) Chamado de refratário, o estágio 3 inclui crises com duração de 10 a 30 minutos, nas quais tratamentos de segunda e terceira linha frequentemente apresentam resposta mínima ou ausente.
- (E) Anestésicos inalatórios são reservados como recurso de última opção dentro do tratamento de terceira linha.

40. Com relação ao sistema nervoso, analise as afirmações a seguir e marque a alternativa INCORRETA:

- (A) Durante a avaliação neurológica, alterações na posição ou inclinação da cabeça podem indicar comprometimento do sistema vestibular.
- (B) Na análise do reflexo pupilar à luz, a resposta consensual mede a contração da pupila do olho que está sendo iluminado.
- (C) Se, ao pressionar um dígito do membro pélvico de um cão, não houver reação ao estímulo doloroso, isso sugere lesão do neurônio motor inferior (NMI).
- (D) Se, ao pressionar um dígito do membro torácico de um cão, não houver resposta ao estímulo doloroso, isso indica comprometimento do arco reflexo.
- (E) Na análise do reflexo pupilar à luz, o reflexo direto é a contração da pupila do próprio olho que recebe a luz.

41. A asma é uma causa comum de doença respiratória em felinos, podendo resultar em tosse, chiados e episódios de angústia respiratória. Com base nessa afirmação, são fatores que podem contribuir para obstrução das vias aéreas menores em gatos com asma, EXCETO:

- (A) Fibrose
- (B) Exsudato inflamatório nos lúmens das vias aéreas
- (C) Broncoconstricção
- (D) Normoplasia epitelial
- (E) Enfisema

42. Entre as enfermidades e condições que podem levar ao aumento da ingestão de água e da produção de urina em cães (polidipsia e poliúria respectivamente), assinale a alternativa que NÃO está associada a esse quadro clínico:
- (A) Insuficiência renal
  - (B) Diabetes mellitus
  - (C) Hiperadrenocorticism
  - (D) Hipotireoidismo
  - (E) Uso de corticoide
43. A piometra é uma afecção uterina grave, que se enquadra em situação emergencial, uma vez que pode ser potencialmente fatal em cadelas acometidas. Considerando os aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos dessa enfermidade, assinale a alternativa CORRETA:
- (A) A piometra ocorre exclusivamente em cadelas jovens durante o estro.
  - (B) A presença de secreção vulvar purulenta confirma obrigatoriamente o diagnóstico de piometra aberta.
  - (C) O tratamento de eleição para a maioria dos casos de piometra é a ovariosalpingo-histerectomia associada à estabilização clínica do animal.
  - (D) O uso isolado de antibióticos por via oral é suficiente para o tratamento definitivo da piometra.
  - (E) A piometra está relacionada à queda abrupta dos níveis de progesterona logo após o cio.
44. As afecções do sistema locomotor em cães e gatos podem envolver ossos, articulações, músculos e tendões, resultando em claudicação e dor. Com base nos princípios clínicos e ortopédicos, assinale a alternativa CORRETA:
- (A) A claudicação de início agudo está sempre relacionada a doenças degenerativas articulares.
  - (B) Fraturas em gatos geralmente apresentam menor risco de complicações devido à alta capacidade de consolidação óssea da espécie.
  - (C) A ruptura do ligamento cruzado cranial é uma das principais causas de claudicação do membro pélvico em cães de médio e grande porte.
  - (D) A displasia coxofemoral é uma enfermidade exclusiva de cães de médio porte, não sendo descrita em gatos.
  - (E) Doenças musculares raramente causam alterações na marcha de cães e gatos.
45. A Rinotraqueíte infecciosa felina é uma enfermidade respiratória comum em gatos, especialmente em ambientes com alta densidade populacional. Sobre essa doença, assinale a alternativa CORRETA:
- (A) É causada por uma bactéria gram-negativa e apresenta caráter exclusivamente sistêmico.
  - (B) A infecção não permite que o animal se torne portador após a recuperação clínica.
  - (C) O tratamento baseia-se apenas no uso de antibióticos de amplo espectro na maioria dos casos.
  - (D) A vacinação elimina completamente o risco de infecção pelo agente causador.
  - (E) Os sinais clínicos incluem espirros, secreção nasal e conjuntivite, podendo evoluir para úlcera de córnea.

46. Nos gatos, a hipertensão arterial sistêmica geralmente ocorre como consequência de outras enfermidades ou condições clínicas. Assinale a alternativa que NÃO representa uma causa frequente de hipertensão secundária em felinos:
- (A) Encefalopatia hipertensiva
  - (B) Hipertireoidismo
  - (C) Diabetes mellitus
  - (D) Doença renal crônica
  - (E) Hiperaldosteronismo
47. Um cão da raça Cocker Spaniel é encaminhado para avaliação na clínica médica de pequenos animais do Hospital Veterinário Adílio Santos Azevedo (HV-ASA), do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), após confirmação diagnóstica de anemia hemolítica imunomediada (AHIM). Considerando o protocolo terapêutico indicado para essa enfermidade, assinale a alternativa que NÃO deve fazer parte da prescrição medicamentosa.
- (A) Leflunomida
  - (B) Dexametasona
  - (C) Micofenolato de mofetila
  - (D) Azatioprina
  - (E) Vincristina
48. A gastrite em cães pode apresentar caráter agudo ou crônico e está associada a diferentes fatores etiológicos. Considerando os aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos dessa afecção, assinale a alternativa CORRETA:
- (A) A gastrite aguda em cães manifesta-se predominantemente por vômitos, podendo estar relacionada à ingestão de alimentos inadequados, corpos estranhos ou agentes irritantes.
  - (B) A gastrite crônica em cães é sempre causada por infecção bacteriana e apresenta resolução espontânea sem necessidade de tratamento.
  - (C) O diagnóstico definitivo de gastrite em cães pode ser estabelecido exclusivamente com base nos sinais clínicos apresentados pelo animal.
  - (D) O uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) é indicado no tratamento da gastrite, por promover proteção direta da mucosa gástrica.
  - (E) A endoscopia digestiva alta não possui utilidade na avaliação de cães com suspeita de gastrite.

49. Um cão adulto é trazido à emergência após apresentar mal súbito, taquipneia, mucosas pálidas e pulso fraco. O histórico indica que o animal ingeriu recentemente um provável corpo estranho. Durante a avaliação inicial, o paciente apresentava hipotensão e respiração superficial. Considerando as prioridades emergenciais, assinale a conduta mais adequada neste primeiro momento:

- (A) Iniciar antibióticos de amplo espectro imediatamente, antes de qualquer suporte hemodinâmico para evitar infecções.
- (B) Oferecer alimentação líquida via sonda para evitar hipoglicemia durante a avaliação.
- (C) Encaminhar diretamente para cirurgia para remoção do corpo estranho, sem estabilização prévia.
- (D) Administrar anti-inflamatórios e analgésicos antes da avaliação completa, para reduzir estresse e dor.
- (E) Administrar fluidoterapia intravenosa para estabilização circulatória, fornecer oxigenoterapia e monitorar sinais vitais, para tentar estabilizar o quadro, antes de realizar os exames para fechamento do diagnóstico.

50. A mucocoele da vesícula biliar em cães consiste na dilatação da vesícula devido ao acúmulo excessivo de muco, frequentemente associado à hiperplasia epitelial, sendo atualmente uma das principais causas de doença biliar extra-hepática. Sobre essa condição, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Os sinais clínicos comuns são altamente específicos, incluindo cianose, convulsões e “posição de prece”.
- (B) A cultura de bile deve ser realizada rotineiramente por punção percutânea guiada por ultrassonografia.
- (C) O tratamento de escolha em casos graves é exclusivamente clínico, utilizando ácido ursodesoxicólico e antibióticos como gentamicina.
- (D) A ultrassonografia abdominal é o exame de escolha para o diagnóstico da mucocoele de vesícula biliar.
- (E) O tratamento cirúrgico não é uma opção indicada.